

# เอกสารข้อมูล (FACTSHEET) ? ? ?

## การรักษาหนองในเทียมให้คุณ (Chlamydia Treatment for you)

### ข้อมูลสำหรับคู่ของผู้ป่วย (Partner information)

THAI

หนองในเทียมเป็นการติดเชื้อที่แพร่ถึงกันได้โดยผ่านสารคัดหลั่งระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ทางปาก ช่องคลอดและทวารหนัก

ผู้ที่เป็โรคหนองในเทียมโดยเฉพาะผู้หญิง ปกติแล้วจะไม่แสดงอาการ แต่หากมีอาการ อาจรวมถึง:

- เจ็บ/แสบร้อนเมื่อปัสสาวะ
- เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์
- มีหนอง/ของเหลวออกมาจากอวัยวะเพศชาย อวัยวะเพศหญิง และ/หรือทวารหนัก

### ทำไมฉันจึงต้องรับการรักษาโรคหนองในเทียม

เพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือแพร่เชื้อกลับมาสู่คู่ของคุณ หรือแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น ถ้าคุณได้มีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่เป็หนองในเทียม คุณก็จะมีแนวโน้มที่จะเป็นด้วยเช่นกัน

แพทย์ได้ส่งยาอะซิโทรไมซิน (azithromycin) ให้กับคู่ของคุณเพื่อนำมาให้คุณ เป็นวิธีที่จะรักษาโรคหนองในเทียมที่คุณเป็นได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า การบำบัดรักษาคู่ของคู่ผู้ป่วยโดยผ่านผู้ป่วย (Patient Delivered Partner Therapy – PDPT)

### ยานี้คือยาอะไร

เป็นยาปฏิชีวนะชื่อ อะซิโทรไมซิน (azithromycin) ซึ่งรักษาโรคหนองใน แต่จะไม่รักษาโรคติดเชื้ออื่น ๆ ซึ่งมีการแพร่เชื้อระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ คุณยังคงต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually Transmitted Infections - STIs) อื่น ๆ

### จดทานยานี้ถ้าคุณมีอาการดังต่อไปนี้:

ถ้าคุณมีอาการแพ้ยาปฏิชีวนะชนิดใดก็ตาม หรือมีปัญหาสุขภาพร้ายแรงในระยะยาว หรือมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการทานยาตัวนี้ กรุณาอ่านเอกสารกำกับยาที่มากับแผงยา หรือปรึกษาแพทย์ก่อนทานยา

ถ้าคุณมีอาการปวดในบริเวณท้องส่วนล่าง ปวดเกร็ง เจ็บระหว่างมีเพศสัมพันธ์ ปวดอั้นกะ มีไข้ หรืออ้วก (อาเจียน) ต้องไปพบแพทย์ทันที

### ถ้าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือคิดว่าฉันอาจจะตั้งครรภ์

ปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มใช้ยา ควรไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อทำการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ซึ่งอาจมีการแพร่เชื้อระหว่างการตั้งครรภ์และการคลอด แจ้งให้แพทย์ทราบว่าคู่คุณได้รับการรักษาเนื่องจากคู่ของคุณเคยเป็นหนองในเทียม

### ควรรับประทานยานี้อย่างไร

ทานยานี้ทั้งหมด (2 เม็ดพร้อมกัน) ในครั้งเดียว (ทางปาก) อย่าแบ่งยาให้ผู้อื่น คุณจะต้องทานยาทั้งสองเม็ดด้วยกันเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ ทานยาพร้อมอาหาร – เพราะช่วยลดโอกาสเสี่ยงที่จะปวดมวนท้องให้น้อยลง

ถ้าคุณอ้วก (อาเจียน) ภายใน 2 ชั่วโมงที่ทานยา แปลว่ายาจะไม่ได้ออกฤทธิ์และคุณจะต้องไปรับยาเพิ่มจากแพทย์ของคุณ

### ยานี้มีผลข้างเคียงหรือไม่

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะสามารถทนต่อฤทธิ์ของยาอะซิโทรไมซินได้ หากทานตามคำแนะนำข้างต้น บางรายมีอาการปวดมวนท้อง (ท้องเสีย คลื่นไส้ ปวดท้อง อาเจียน) แต่อาการแพ้อย่างรุนแรงพบได้น้อยมาก

ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพใด ๆ ที่ร้ายแรงหลังจากทานยานี้ โทรฯ หมายเลข 000 ทันที หรือรีบไปยังแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

### ฉันควรทำอะไรต่อไป

1. จดการมีเพศสัมพันธ์ (ทางช่องคลอด ทางปาก หรือทางทวารหนัก) อย่างน้อย 7 วันหลังจากที่คุณและคู่ของคุณปัจจุบันของคุณได้รับการรักษาเรียบร้อยแล้ว คุณอาจติดเชื้อหนองในเทียมซ้ำอีกหากคุณมีเพศสัมพันธ์ก่อนช่วงเวลานี้
2. ไปพบแพทย์และตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ
3. ถ้าคุณมีคู่คนอื่นนอกจากคนที่นำยานี้มาให้คุณ แจ้งให้คนเหล่านั้นทราบว่า ต้องไปตรวจหาเชื้อหนองในเทียมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ

### สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการขอความช่วยเหลือ

กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 1800 451 624 หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ [Play Safe](#)

### แพทย์ผู้ทำการส่งยา:

ชื่อ: \_\_\_\_\_  
คลินิก: \_\_\_\_\_  
โทร: \_\_\_\_\_