

เอกสารข้อมูล (FACTSHEET)



การรักษาหนองในเทียมให้กับคู่ของคุณ (Chlamydia treatment for your partner)

ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย (Patient information)

THAI

ทำไมคู่ของฉันต้องรับ การรักษาโรคหนองในเทียม

เพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาร้ายแรงต่อสุขภาพของพวกเขาเอง หรือแพร่เชื้อกลับมาสู่คุณ หรือแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น

การรักษาหนองในเทียมให้กับคู่ของคุณ รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า การบำบัดรักษา คู่ของผู้ป่วยโดยผ่านผู้ป่วย (Patient Delivered Partner Therapy - PDPT) และเป็นวิธีที่รวดเร็วและง่ายดาย ในการให้คู่นอนได้รับการรักษาโรคหนองในเทียมโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์เอง

PDPT ทำงานอย่างไร

แพทย์จะสั่งยาอะซิโทรไมซิน (azithromycin) ให้กับคุณเพื่อนำไปให้คู่นอนทุกคนของคุณในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา

ฉันควรทำอะไรต่อไป

1. ตัวคุณเองให้ทานยา
2. งดการมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลา 7 วันหลังจากทานยา
3. บอกคู่นอนทุกคนของคุณในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาให้ทราบ
4. นำยาจาก PDPT ไปให้คู่นอนทุกคนในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาได้ ทานและให้เอกสารข้อมูลไปอ่าน
5. พยายามชักชวนให้คู่ไปพบแพทย์หรือไปคลินิกเพื่อตรวจหาเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ด้วย
6. ไปพบแพทย์ในอีก 3 เดือนเพื่อตรวจหาเชื้อหนองในเทียม

จะบอกคู่อนอย่างไร ได้ไปรักษาหนองในเทียม

อธิบายว่าคุณได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นและได้รับการรักษาโรคติดต่อที่เรียกว่าหนองในเทียม ซึ่งเป็นโรคที่แพร่เชื้อได้ระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ ดังนั้น เขาก็อาจจะได้รับเชื้อไปเช่นกัน พยายามชักชวนให้คู่ของคุณทุกคน อ่าน "ข้อมูลสำหรับคู่"

ต้องการความช่วยเหลือ

ดูวิธีการ "คุยกับคู่ของคุณ" ได้ที่เว็บไซต์ [Play Safe](#)

ยานี้รักษาโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ได้ทุกประเภทหรือไม่

ไม่ ยาดังกล่าวนี้จะรักษาเฉพาะหนองในเทียมเท่านั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คู่นอนของคุณควรไปพบแพทย์ด้วย เพื่อตรวจหาเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ รวมไปถึงเอชไอวี (HIV)

ถ้าคู่ของฉันกำลังตั้งครรรภ์ หรือคิดว่าตนอาจจะตั้งครรรภ์

คู่ของคุณควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มใช้ยา ควรไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อทำการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ซึ่งอาจมีการแพร่เชื้อระหว่างการตั้งครรรภ์และการ

หลังจากนำยาให้คู่ทานแล้วควร ทำอะไรต่อไป

งดการมีเพศสัมพันธ์ทุกรูปแบบ (ทางปาก ทางช่องคลอด หรือทางทวารหนัก) จนกระทั่งผ่านไป 7 วันหลังจากที่ทั้งคุณและคู่ของคุณได้รับการรักษาแล้ว หากมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาเจ็ดวันนั้น คุณอาจติดเชื้อหนองในเทียมซ้ำได้

ไปรับการตรวจหาหนองในเทียมซ้ำอีก ครั้งใน 3 เดือนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้รับเชื้อซ้ำอีกครั้ง เป็นเรื่องปกติมากที่จะติดเชื้อซ้ำอีกครั้งหลังจากติดเชื้อหนองในเทียมครั้งแรกไม่นาน

ถ้าคู่ของคุณไม่ต้องการทานยา

บอกให้คู่ของคุณทราบว่าถ้าไม่รักษา อาจส่งผลให้เกิดปัญหาร้ายแรงทางสุขภาพได้

คู่ของคุณสามารถไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อทำการตรวจโรคและรับการรักษาโรคหนองในเทียมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ หรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขด้านล่างเพื่อขอคำแนะนำ โดยไม่ควรมีเพศสัมพันธ์หรือควรใช้ถุงยางอนามัย จนกว่าจะได้รับการตรวจหาเชื้อและรับการรักษาหนองในเทียม

ถ้าไม่สามารถรับยาไปให้คู่นอน ทั้งหมดภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา

แจ้งให้แพทย์ของคุณทราบ เพื่อที่แพทย์จะได้ให้ความช่วยเหลือในการติดต่อคู่นอนของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือ

กรุณาโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 1800 451 624 หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ [Play Safe](#)

แพทย์ผู้ทำการส่งยา:

ชื่อ: _____
คลินิก: _____
โทร: _____