

# 资料单张 (FACTSHEET)

## 为你提供衣原体治疗 (Chlamydia treatment for you) 伴侣资讯 (Partner information)



SIMPLIFIED CHINESE

### 衣原体是一种通过口腔、阴道和肛门性交时的体液传播的感染。

感染衣原体的人，尤其是女性，通常没有症状。若有症状，可能包括：

- 排尿时感疼痛 / 灼热
- 性交后出血
- 阴茎、阴道和 / 或肛门分泌脓液 / 分泌物。

### 为什么我需要接受衣原体治疗？

这样可以避免引发严重健康问题、传染给伴侣或传播给其他人。若你曾与衣原体感染者发生性行为，很可能也已受感染。

医生已为你的性伴侣提供阿奇霉素 (azithromycin) 药物，由其转交予你。这种“患者交付伴侣治疗法” (简称 PDPT) 能让你更便捷地及时接受衣原体治疗。

### 这是什么药物？

这是一种名为阿奇霉素的抗生素，可以治疗衣原体感染，但无法治疗其他性传播感染。你仍需就医接受其他性传播感染 (STI) 的检测。

### 若你存在以下任一情况， 请勿服用本药品：

对任何抗生素过敏、患有严重长期健康问题，或对服用本药品存在任何疑虑。

服用前请参阅药品包装内附的说明书，或向医生咨询。

若出现下腹疼痛、绞痛、性交疼痛、睾丸疼痛、发热或呕吐症状，请立即就医。

### 如果我怀孕了或怀疑自己可能怀孕怎么办？

服用药物前请咨询医生。应尽快就医接受其他性传播感染的检测，这些感染可能在怀孕和分娩期间传播。告知医生你接受治疗是因为性伴侣感染了衣原体。

### 我应该如何服用药物？

立即服用全部药物 (2片同时服用，口服)。请勿与他人共享药物，必须同时服用两片才能发挥药效。请随餐服用——这样可降低胃部不适的风险。

若服药后2小时内呕吐，药物将失效，需向医生获取更多药物。

### 该药物会引起副作用吗？

只要按照上述说明服用阿奇霉素，大多数人可耐受。部分人可能出现胃部不适 (腹泻、恶心、胃痛、呕吐)。严重过敏反应极为罕见。

**服用本药后若出现任何严重健康问题，请立即拨打 000 或前往最近的医院急诊科。**

### 接下来我应该怎么做？

1. 你和当前性伴侣接受治疗，至少 7 天内应避免任何性行为 (包括阴道性交、口交或肛交)。在此期间，发生性行为可能导致再次感染衣原体。
2. 就医接受其他性传播感染检测。
3. 除给你药的这个人以外，若你还有其他性伴侣，请告知他们需接受衣原体及其他性传播感染检测。

### 如需更多资讯或帮助

请致电 1800 451 624 或访问

[Play Safe](#) 网站。

#### 开处方医生：

姓名：\_\_\_\_\_

诊所：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_