

信息资料 (FACTSHEET)



为您伴侣提供衣原体治疗

(Chlamydia treatment for your partner)

患者资讯 (Patient information)

SIMPLIFIED CHINESE

为什么我的伴侣都需要接受衣原体治疗?

这样可以避免他们出现严重健康问题、将感染再次传染给您或传播给其他人。

伴侣衣原体治疗也称为“患者交付伴侣治疗法”(简称 PDPT), 是一种快速便捷的方式, 让性伴侣无需面诊医生即可接受衣原体治疗。

PDPT 如何运作?

您的医生已为您提供阿奇霉素 (azithromycin) 药物, 用于给过去 6 个月内的任何性伴侣服用。

接下来我应该怎么做?

1. 自行服用药物。
2. 服药后7天内避免性行为。
3. 告知您过去六个月内的所有性伴侣。
4. 向过去六个月内的每位性伴侣提供 PDPT 药物及伴侣资讯资料单张。
5. 鼓励他们前往医生或诊所接受其他性传播感染检测。
6. 三个月后复诊, 重新检测衣原体感染情况。

如何告知我的性伴侣我曾接受过衣原体治疗?

向他们说明您已被确诊并治疗过一种名为衣原体的感染。该病通过性行为传播, 因此他们也可能有此感染。

鼓励所有伴侣阅读您提供的“伴侣资讯”材料。

需要帮助做准备吗?

请访问 [Play Safe](#) 网站查看“与伴侣沟通”(Talk to your Partner) 的方法。

这种药物能治疗所有性传播感染吗?

不能。本药物仅用于治疗衣原体感染。因此您的伴侣也必须就医检测其他性传播感染(包括艾滋病毒 HIV)。

如果伴侣已怀孕或怀疑怀孕怎么办?

服药前, 您的伴侣应咨询医生。她需尽快就医检测其他性传播感染, 这些感染可能在妊娠及分娩期间传播。

给我的伴侣此种药物后我应该怎么做?

在您和当前伴侣完成治疗后 7 天内, 请避免任何性行为(包括口交、阴道性交或肛交)。在此期间发生性行为可能导致再次感染衣原体。

请于 3 个月后复查衣原体检测, 确保没有发生再次感染。首次感染衣原体后短期内再次感染的情况很常见。

如果伴侣不愿服药怎么办?

请告知伴侣, 不接受治疗可能导致严重的健康问题。

伴侣应尽快就医接受衣原体及其他性传播感染的检测与治疗, 或拨打下方电话咨询。在完成衣原体检测和治疗前, 应避免性行为或务必使用安全套。

如果我无法将药物带给过去6个月内所有性伴侣怎么办?

请告知您的医生, 他们可协助联系您的伴侣。

如需更多资讯或帮助

请致电 1800 451 624 或访问

[Play Safe](#) 网站。

开处方医生:

姓名: _____

诊所: _____

电话: _____